

Relace


→ podmnožina k. s. splňující danou vlastost

Def: relace mezi množinami X, Y je libovolná podmnožina $X \times Y$

Relace na množině $X =$ relace mezi X, X

→ pro $X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow (x, y) \in R \equiv x R y$

① Rovnost: $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$




↳ Diagonální relace

$\Delta_x := \{(x, x) \mid x \in X\} \rightarrow$ vždy existuje

② Dělitelnost: $x \mid y$

	1	2	3	4	5
1	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
2		shaded		shaded	
3			shaded		
4				shaded	
5					shaded



$\rightarrow 2 R 2$
 $1 R 4$

③ $x + y \leq 5$

	1	2	3	4	5
1	shaded	shaded	shaded	shaded	shaded
2	shaded	shaded	shaded	shaded	
3	shaded	shaded	shaded		
4	shaded	shaded			
5	shaded				

④ \emptyset prázdná relace

⑤ $X \times Y$ univerzální relace

} vždy existují

Potenciální množina

Def: Potenciální množina množiny X obsahuje všechny $A \subseteq X$:

$$P(X) = 2^X = \{A \mid A \subseteq X\}$$

$$|P(X)| = 2^{|X|}$$

Inverzní relace

Def: Pro relaci $R \subseteq X \times Y$ definujeme inverzní relaci $R^{-1} \subseteq X \times Y$:


$$\forall x \in X, \forall y \in Y: y R^{-1} x \equiv x R y$$

- obrázek se překlopí podle diagonály, u orientovaného grafu se otočí šipky

Složení relací

Def: Pro relaci $R \subseteq X \times Y$ a $S \subseteq Y \times Z$ definujeme jejich složení $R \circ S \subseteq X \times Z$



$$\forall x \in X, \forall z \in Z: x (R \circ S) z \Leftrightarrow (\exists y \in Y: x R y \wedge y S z)$$



$$R \circ S = \{(x, z) \mid x \in X, z \in Z, \text{ takových že } \exists y \in Y: (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$$

$$\text{př: } R \subseteq X \times Y, \Delta_Y \quad R \circ \Delta_Y = R$$

$$\Delta_X \circ R = R$$




Zobrazení

Def: Zobrazení z X do Y je relace f mezi X, Y t.ž.

$$\forall x \in X \exists! y \in Y: x R y$$

↳ existuje právě jedno $y \in Y$



VZOR

OBRAZ

↳ značení $f: X \rightarrow Y$

$$\text{pro } x \in X \quad f(x) = y \Leftrightarrow x f y$$

$$\text{pro } A \subseteq X \quad f[A] := \{f(a) \mid a \in A\}$$

$f[A]$ = množina obrazů pro vazy A


- ① $\sin: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ přivázení
 ② $\text{sgn}: \mathbb{R} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{pro } x > 0 \\ 0 & \text{pro } x = 0 \\ -1 & \text{pro } x < 0 \end{cases}$
 ③ $\Delta_x: x \mapsto x$ ← identita / diagonální relace

④ mohutnost množiny

$|_|_ : P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$

⑤ $f(a, b) = a + b: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

• Složení funkcí



\Rightarrow problem: $(f \circ g)(x) = g(f(x))$: $g(f(x)) = y \Leftrightarrow f(x) g y$
 $f(x) = z \Leftrightarrow x f z$
 $\Rightarrow x f z \wedge z g y \equiv x (f \circ g) y$
 $\Rightarrow y = (f \circ g)(x)$



• Vlastnosti funkcí

Def: Funkce $f: X \rightarrow Y$ je:

- ① prostá (injektivní) $\equiv \forall x_1, x_2 \in X: x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- ② "na" Y (surjektivní) $\equiv \forall y \in Y \exists x \in X: f(x) = y$ \rightarrow pokrývá celou Y
- ③ 1-1 (bijektivní) $\equiv \forall y \in Y \exists! x \in X: f(x) = y$ \rightarrow je prostá \wedge "na"

• Inverzní funkce

• pro funkci f je f^{-1} funkce $\Leftrightarrow f$ je bijektivní



\rightarrow 1 obraz \rightarrow 2 prvky \Rightarrow není fce
 \rightarrow 1 obraz \rightarrow žádný obraz \Rightarrow není fce

není velký problém
 \Rightarrow stačí omezit def. obor

• pro f prostou: f^{-1} je funkce a $Y' = f[X]$ do X
↳ vřídny obraty

• Vlastnosti relací

Def: Relace R na X je

① Reflexivní $\equiv \forall x \in X: xRx \equiv \Delta_x \subseteq R$

② Symetrická $\equiv \forall x, y \in X: xRy \Leftrightarrow yRx \equiv R = R^{-1}$

③ Antisymetrická $\equiv \forall x, y \in X; x \neq y: (xRy \Rightarrow \neg yRx) \equiv R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_x$

④ Transitivní $\equiv \forall x, y, z \in X: xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz \equiv R \circ R \subseteq R$

$x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z$

$x = y \wedge y = z \Rightarrow x = z$



Def: Relace R je ekvivalenční \equiv

R je reflexivní \wedge symetrická \wedge transitivní

$=$ na \mathbb{R}

$=$ na \mathbb{Z}

\equiv mod k na \mathbb{Z}

$\hookrightarrow x=y \Leftrightarrow k \mid (x-y)$

geometrická shodnost a podobnost

• Ekvivalenční třída

Def: Pro R ekvivalence na X definují Ekvivalenční třídu prvka $x \in X$

$$R[x] := \{y \in X \mid xRy\}$$

Věta:

① $\forall x \in X: R[x] \neq \emptyset$

② $\forall x, y \in X: R[x] = R[y] \vee R[x] \cap R[y] = \emptyset$

③ $\{R[x] \mid x \in X\}$ jednoznačně nájde R

Důkaz:

① R je reflexivní $\Rightarrow xRx \Rightarrow R[x] \neq \emptyset$

② chceme ukázat, že $R[x] \cap R[y] \neq \emptyset \Rightarrow R[x] = R[y]$

níže: $\exists a \in R[x] \cap R[y]$

chceme: $\forall a \in R[x]: a \in R[y]$



obr. 1. \Rightarrow níže $xRx \Rightarrow aRx$

$yRa \Rightarrow aRy$

$aRx \Rightarrow xRa$

symetrie

transitivita: $aRx, xRa \Rightarrow aRa$

$aRa, aRy \Rightarrow$ aRy

③ Ty třídy rozloží X na disjunktivní reprezentivní množiny, a toví že prvky nich jsou všechny ekvivalentní se všemi a mezi množinami nejsou žádné ekvivalentní

Rozklad

\rightarrow množina množin

Def.: Rozklad množiny X je množinový systém $\mathcal{Q} \subseteq P(X)$ t.j.:

① $\forall S \in \mathcal{Q}: S \neq \emptyset$

② $\forall S, T \in \mathcal{Q}; S \neq T: S \cap T = \emptyset$

③ $\bigcup_{S \in \mathcal{Q}} S = X$

\rightarrow rozklad a ekvivalence jsou dva kontrární problémy na stejný jev

Symetrická diference množin

Def.: Symetrická diference množin A a B je množina obsahující všechny jejich prvky, kromě těch společných

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



• Vspořádaní

Def: Vspořádaní na množině X je relace R na X , která je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní.

$$xRx$$

nenastane

$$xRy \wedge yRx$$

pro $x \neq y$

$$xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$$

• Vspořádaná množina

Def: Vspořádaná množina je usp. dvojice (X, R) , kde X je množina a R je nějaké vspořádaní na X .

Def: $x, y \in X$ jsou porovnatelné $\equiv xRy \vee yRx$

Def: Vspořádaní je lineární (úplné) \equiv každé dva prvky jsou porovnatelné

Def: Částečné vspořádaní může a nemusí být úplné \rightarrow ČM

\rightarrow Každému vspořádaní \leq na X přiřadíme relaci $<$ na X :

$$a < b \equiv a \leq b \wedge a \neq b.$$

$<$ je tzv. ostře vspořádaní.

Pozorování: $<$ není reflexivní (je irreflexivní $\forall a: \neg aRa$)

je antisymetrické

je tranzitivní

\Rightarrow není to vspořádaní

\rightarrow Příklady

① (\mathbb{N}, \leq) lineární

② (\mathbb{Q}, \leq) lineární, husté $\rightarrow \forall a < b \exists c: a < c < b$.

③ (X, Δ_x) žádné dva různé prvky nejsou porovnatelné \rightarrow ČM

④ $(\mathbb{N}^+, |)$ $a|a, a|b \wedge b|a \Rightarrow a=b \Rightarrow$ je antisym. částečné

⑤ $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ $A \subseteq A, A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A=B$ částečné

inkluze

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$$

⑥ lexikografické usporiadání: Máme usporádanou množinu znaků, abecedu (X, \leq)

Def: (X^2, \leq_{LEX}) ← chceme porovnávat řetězce znaků

$$(a_1, a_2) \leq_{LEX} (b_1, b_2) \equiv a_1 < b_1 \vee (a_1 = b_1 \wedge a_2 \leq b_2)$$

Def: (X^*, \leq_{LEX}) : $a_1, \dots, a_k \leq_{LEX} b_1, \dots, b_k$

↳ všechny
končné
postupnosti
prvků z X

$$\begin{array}{c} a = b \\ \Downarrow \\ a \leq_{LEX} b \end{array}$$

$$\exists i: a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots$$

$$a_{i-1} = b_{i-1}, a_i \neq b_i$$

$$\bullet a_i < b_i \Rightarrow a \leq_{LEX} b$$

$$\bullet a_i > b_i \Rightarrow a \not\leq_{LEX} b$$

$$a \text{ je prefixem } b \Rightarrow a \leq_{LEX} b$$

$$b \text{ je prefixem } a \Rightarrow a \not\leq_{LEX} b \equiv \neg(a \leq_{LEX} b)$$

• Relace bez prostředního předchůdce

Def: $a \triangleleft b \equiv a < b \wedge (\nexists c: a < c \wedge c < b) \Rightarrow$ neklesíme nic
plynoucí z tranzitivity

• Hasseiv diagram


- znázornění usporádání \rightarrow konečných částicně usf. množin ČUM

- příklady

① dělitelnost na $\{1, \dots, 12\}$

$(2, 12)$ není znázorněno, protože
plyne z tranzitivity


$$\Rightarrow 2 | 4 \wedge 4 | 12$$



$\rightarrow 8, 12, 9, 10, 7, 11$ jsou max, ale ne největší!
↳ 1 je nejmenší i min

② $(P(\{1,2,3\}), \subseteq)$

- $\{1,2,3\}$ je maximální
i největší prvek
- \emptyset je minimální
i nejmenší prvek



Def: Pro ČUM (X, \leq) je $x \in X$:

- ① minimální $\equiv \nexists y \in X : y < x$
- ② nejmenší $\equiv \forall y \in X : x \leq y$
- ③ maximální $\equiv \nexists y \in X : y > x$
- ④ největší $\equiv \forall y \in X : x \geq y$

V diagonální
relaci je každý
prvek min a max
rovně

Věta: Každá konečná, neprázdná ČUM má minimální a maximální prvek.

Důkaz: Zvolíme $x_1 \in X$ libovolně ← důkaz pro minimální

1, buď x_1 je minimální ✓

2, nebo $\exists x_2 < x_1$ a s ním pokračují

$$\Rightarrow x_1 > x_2 > x_3 > \dots > x_n$$

Ahle nemůže být nekonečně dlouho, ať se prvek zopakuje

⇒ Počet $n > |X|$ pro $\exists i, j : i \neq j : x_i = x_j$

→ $x_i > x_{i+1} > \dots > x_j = x_i$
 → $x_i > x_j = x_i \Rightarrow x_i > x_i \Rightarrow$ SPOR


• Řetězce a antiřetězce

Def: $A \subseteq X$ pro ČUM (X, \leq) je

① řetězec $\equiv (A, \leq)$ je lineární UM \Leftrightarrow všechny prvky jsou porozmatelné

② antiřetězec $\equiv \forall a, b \in A, a \neq b$ jsou neporozmatelné prvky

• Kombinatorika



funkcí: $A \rightarrow B$

$\rightarrow m$ možností pro $f(a_1)$
 $\rightarrow m$ možností pro $f(a_2)$
 \vdots
 $\rightarrow m$ možností pro $f(a_n)$

} celkem m^n možností
 \rightarrow je jedno co je A , za prvky, můžeme je považovat za čísla

Def: $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$ \Rightarrow $\# f: [n] \rightarrow [n] = m^n$

② $|P([n])|$

Def: Charakteristická funkce podmnožiny $A \subseteq X$ je $C_A: X \rightarrow \{0, 1\}$

$$C_A(x) = \begin{cases} 0 & x \notin A \\ 1 & x \in A \end{cases} \quad \text{BIJEKCE } A \mapsto C_A$$

\Rightarrow každé podmnožině můžeme jednoznačně přiřadit funkci a každé funkci sdruží z X do $\{0, 1\}$ můžeme přiřadit podmnožinu

\Rightarrow každé podmnožině $A \in P([n])$ přiřadíme C_A a spočítáme je.

\rightarrow funkcí $f: [n] \rightarrow [2]$ je 2^n

\Rightarrow $|P([n])| = 2^n$

\rightarrow nebo když máme n voleb jestli prvek je nebo není $\sim A \subseteq X$.

③ # Sudých vs. # Lichých podmnožin *

$$\mathcal{Y} = \{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ je sudá}\}$$

$$\mathcal{Z} = \{A \subseteq [n] \mid |A| \text{ je lichá}\}$$

$\dot{\cup} \equiv$ sjednocení dvou disjunktních množin.

$$\mathcal{Y} \dot{\cup} \mathcal{Z} = P([n])$$

$$\Rightarrow |\mathcal{Y}| + |\mathcal{Z}| = 2^n$$

\Rightarrow můžeme $|\mathcal{Y}| = |\mathcal{Z}|$ a z toho

$$\underline{|\mathcal{Y}| = |\mathcal{Z}| = 2^{n-1}}$$

\Rightarrow sestrojíme bijekci mezi \mathcal{Y} a \mathcal{Z}

\rightarrow nefunguje to pro \emptyset

zvolím $a \in [n]$, $A \subseteq [n]$ libovolně, pak $f: 2^{[n]} \rightarrow 2^{[n]}$ je

$$f(A) = \begin{cases} A \cup \{a\} & \text{pokud } a \notin A \\ A \setminus \{a\} & \text{pokud } a \in A \end{cases} \equiv A \Delta \{a\}$$

f se sudé množiny odílá lichou a pro každou sudou najde nějakou lichou a naopak \Rightarrow je to ta hledaná bijekce.

④ # $f: [m] \rightarrow [m]$ prosté

pro $f(1)$ máme m možností
 pro $f(2)$ $m-1$
 \vdots
 pro $f(m)$ $m-m+1$

n -lá klesající mocnina m

$$\underline{m(m-1)(m-2)\dots(m-m+1) = m!}$$

pro $n > m$ ten součin vyjde 0

\Rightarrow nemá matrici přidávat podmínky

③*

$$(1-1)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} 1^{m-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (-1)^k$$

$$\Rightarrow 0 = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \dots$$

$$\Rightarrow \binom{m}{0} + \binom{m}{2} + \dots = \binom{m}{1} + \binom{m}{3} + \dots$$

$$\Rightarrow |\mathcal{Y}| = |\mathcal{Z}|$$

$$\left| \begin{array}{l} n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \end{array} \right.$$

5) Permutace → existují dva pohledy na věc

a) Permutace jsou bijekce z A do A

$A \xrightarrow{n} A$ → $|A| = |A| \Rightarrow$ počet je zobrazení prosté, což je $n \cdot n \cdot n$
 \Rightarrow # bijekcí = # prostých \Rightarrow # permutací = $n^n = n!$

b) Permutace jsou lineární uspořádání na $[n]$

→ v lineárním uspořádání vždy \exists nejmenší prvek

\Rightarrow postupným odebíráním nejmenších prvků si je můžeme očíslovat

\Rightarrow # permutací = # způsobů očíslování n prvků → což jsou nějaké bijekce $[n] \rightarrow [n]$

\Rightarrow # permutací = $n^n = n!$

6) # k-tic uspořádaných s opakováním - variace s opakováním

= # prvků kartézské mocniny = $|X^k|$, $|X| = n$

→ každou k-tici lze popsat pomocí fce $f: [k] \rightarrow X$

$f(i) = i$ -tý prvek k-tice

\Rightarrow každých funkcí je $|X|^k = n^k \Rightarrow |X^k| = |X|^k$

→ funguje to i pro nekonečné posloupnosti prvků z $X \Rightarrow f: \mathbb{N} \rightarrow X$

k-tic uspořádaných bez opakování - variace bez opakování

→ zase to zachytíme pomocí funkcí, ale prvky se nesmí opakovat,

tedy nás zajímají pouze prosté funkce $f: [k] \rightarrow X$.

\Rightarrow každých funkcí je $n^{\underline{k}}$

k-tic neuspořádaných bez opakování - kombinace bez opakování

= # k-prvkových podmnožin X , $|X| = n$

→ každou neuspořádanou k-tici lze lineárně uspořádat $k!$ způsoby

\Rightarrow # k-tic neuspořádaných $\cdot k! =$ # k-tic uspořádaných

\Rightarrow # k-prvkových podmnožin n -prvkové množiny je $\frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$


$n, k \in \mathbb{N}_0, n \geq k$

⑦ # Relací na X, $|X|=n$

- relaci napíšeme do relacní matice, kde
- každé políčko může být buď 0 nebo 1
- a mám n^2 políček $\Rightarrow \underline{\underline{2^{n^2}}}$

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{kdysi } iRj \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Reflexivních relací na X


 → na diagonále budou jedničky \Rightarrow mám jen $n^2 - n$ voleb
 $\Rightarrow \underline{\underline{2^{n^2 - n}}}$

Symetrických relací na X

→ volitelná je diagonála (n) a vše co je ostře nad diagonálou ($\frac{n^2 - n}{2}$), prvky pod diagonálou odpovídají $\Rightarrow \underline{\underline{2^{\frac{1}{2}n(n+1)}}$

Antisymetrických relací na X

→ na diagonále mám 2 možnosti (0|1)

→ mimo diagonálu mohou nastat 3 situace: 

$$\Rightarrow \underline{\underline{2^n \cdot 3^{\frac{1}{2}n(n-1)}}}$$

• Množina všech k-prvkých podmnožin

Def: Množina všech k-prvkých podmnožin množiny A se značí

$$\binom{A}{k} := \{B \subseteq A \mid |B|=k\} \quad \text{a} \quad \left| \binom{A}{k} \right| = \binom{|A|}{k}$$

• Kombinační čísla

• $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, protože sčítám všechny podmnožiny a těch je 2^n

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

→ vezmu si množinu A s prvkem $a \in A$, $|A|=n$

k-prvké $B \subseteq A \rightarrow a \notin B \Rightarrow \binom{n-1}{k}$

$\searrow a \in B \Rightarrow \binom{n-1}{k-1}$

k-prvkých $B \subseteq A$ je celkem $\binom{n}{k}$



• Binomická věta

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}: (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Důkaz:

$$(a+b)^n = (a+b)(a+b)\dots(a+b)$$

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ a & \cdot & a & \cdot & \dots & \cdot & b \end{array} = a^{n-k} b^k \rightarrow k \text{ členů si vezmu } b$$

$\Rightarrow a$ si vezmu $n-k$ členů

\Rightarrow z n členů si vybírám k b -ček

\Rightarrow celkem $\binom{n}{k}$ způsobů jak to udělat \square

$$\textcircled{1} \quad \underline{a=b=1}: (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k \Rightarrow 2^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$\textcircled{2} \quad \underline{a=1, b=-1}: (1-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k \Rightarrow \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots = 0$$

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \dots$$

\Rightarrow sudých podmnožin je stejně jako lichých

③ # k-tic nespřádaných s opakováním

\rightarrow z n prvků vybírám k -tice \Rightarrow rozdělení k kuliček do n přihrádek


$$\dots | \bullet | \bullet \bullet | \quad | \bullet$$

\Rightarrow $n-1$ čar a k kuliček, celkem $n+k-1$ pozic

(pro $n=5, k=4$)

\Rightarrow všech k -tic je $\underline{\underline{\binom{n+k-1}{k}}}$

Princip inkluze a exkluze



1) pro 2 množiny: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

2) pro 3 množiny: $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Věta: Pro konečné množiny A_1, A_2, \dots, A_m platí

1)
$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[m]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

kolika-tic množin protínáme → alternace znamének → suma všech možných průniků & množin
 k -prvkové seznamy indexů od 1 do m → I jsou indexové množiny

2)
$$\left| \bigcup_{i=1}^m A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [m]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

1) Důkaz: $A := \bigcup_i A_i$. Necht' $a \in A$. Kolikrát přispěl jednov. Kolikrát napravo?

⇒ Necht' $(\# i : a \in A_i) = k$ → a leží v k množinách

① $k > k$ ⇒ v k -tici je alespoň 1 množina bez a ⇒ přispěje 0-krát

② $1 \leq k \leq k$ ⇒ těch k -tic s a je $\binom{k}{k}$ ⇒ přispěje $(-1)^{k+1} \binom{k}{k}$ -krát

⇒ $\sum_{k=1}^k (-1)^{k+1} \binom{k}{k} = - \sum_{k=1}^k (-1)^k \binom{k}{k} = - \left(\sum_{k=0}^k (-1)^k \binom{k}{k} - \binom{k}{0} \right) = - (0 - 1) = 1$ Q.E.D.

2) Důkaz: $\prod_{i=1}^m (1+x_i) = \sum_{I \subseteq [m]} \prod_{i \in I} x_i \Rightarrow \prod_{i=1}^m (1-x_i) = \sum_{I \subseteq [m]} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} x_i$

⇒ Necht' $A := \bigcup_i A_i$. Pro $X \subseteq A$: $C_X: A \rightarrow \{0,1\}$, $C_X(a) = \begin{cases} 1 & a \in X \\ 0 & a \notin X \end{cases}$

⇒ Všimněme si, že platí vztahy, v ③ využijeme $\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cap \overline{Y}$:

① $C_X \cdot C_Y = C_{X \cap Y}$ ③ $1 - C_{X \cup Y} = (1 - C_X)(1 - C_Y)$

② $C_{\overline{X}} = 1 - C_X$ ④ $\sum_{a \in A} C_X(a) = |X|$

⇒ Posazením $X_i = C_{A_i}$ dostaneme

$$\prod_{i=1}^n (1 - C_{A_i}) = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} C_{A_i}$$

$$1 - C_{\bigcup_i A_i} = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} C_{\bigcap_{i \in I} A_i} + 1$$

↳ nechceme prázdny
průnik

prázdny součin byl 1

$$C_{\bigcup_i A_i} = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} C_{\bigcap_{i \in I} A_i}$$

→ nyní by funkce vyhodnotíme
a výsledky sečítáme

$$\sum_{a \in A} C_{\bigcup_i A_i}(a) = \sum_{a \in A} \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} C_{\bigcap_{i \in I} A_i}(a)$$

→ vyvíjíme vztah (9)

$$\Rightarrow \left| \bigcup_i A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Q.E.D.

• Problém sátnářky ⇒ # permutací bez prvního bodu = $n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$

Pr diabolka přišlo n pární s klubouky, které odložili v sátně. Po skončení představení vydala sátnářky párním klubouky zcela náhodně. Pst. že žádný párn nedostal svůj klubouk = ?

- rozdáni klubouků je nějaká bijekce klubouky → pární, takže je to permutace

⇒ Uvažme množinu všech permutací na $[n]$. $S_n := \{\pi \mid \pi \text{ je permutace na } [n]\}$


↳ pokud párn i dostal svůj klubouk, pak $\pi(i) = i$ ← první bod

⇒ Stačí najít pst. že nějaká náhodná permutace π nemá žádný první bod

$$\check{S}_n := |\{\pi \in S_n \mid \forall i: \pi(i) \neq i\}| \Rightarrow P_r = \frac{\check{S}_n}{n!} \leftarrow \text{pocet všech permutací}$$

$$A := \{\pi \in S_n \mid \exists i: \pi(i) = i\} \Rightarrow \check{S}_n = n! - |A| \Rightarrow P_r = 1 - \frac{|A|}{n!}$$

$$A_i := \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\} \Rightarrow A = \bigcup_i A_i, \quad |A_i| = (n-1)!$$



$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)! = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!}$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!$$

$$\Rightarrow P_r = 1 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \quad \underline{\underline{\text{Pro } n \rightarrow \infty \quad P_r \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}}}$$

Odhady faktoriálu

$2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, $2^4 = 16 \rightarrow$ násobím 2

1) $2^m \leq m! \leq m^m$ pro $m \geq 4$: $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$, $4! = 24 \rightarrow$ násobím č. > 2
 $\rightarrow m(m-1)! \leq m \left(\frac{m}{2}\right)^{m-1} = 2 \left(\frac{m}{2}\right)^m$

2) $m^{\frac{m}{2}} \leq m! \leq \left(\frac{m+1}{2}\right)^m \Rightarrow \frac{m}{2} \log(m) \leq \log(m!) \leq m \log(m) \Rightarrow \log(m!) \in \Theta(m \log m)$

Důk: $m! = \sqrt{m!} \cdot \sqrt{m!} = \sqrt{1 \cdot m} \sqrt{2 \cdot (m-1)} \sqrt{3 \cdot (m-2)} \dots \sqrt{m \cdot 1} \rightarrow \otimes = \sqrt{(k+1)(m-k)}$

a) $\sqrt{m} \leq \otimes \Rightarrow m^{\frac{m}{2}} \leq m!$


$0 \leq k \leq m-1$
 \nearrow

b) $(k+1)(m-k) = km + m - k - k^2 = m + k(m-k-1) \geq m$ \square

b) $\sqrt{xy} \leq \frac{1}{2}(x+y) \Rightarrow m! \leq \frac{1}{2^m} (1+m)(2+m-1) \dots (m+1) = \left(\frac{m+1}{2}\right)^m$ \square

3) $e \left(\frac{m}{e}\right)^m \leq m! \leq m \cdot e \left(\frac{m}{e}\right)^m$

$\ln(m!) = \ln(1) + \ln(2) + \dots + \ln(m)$



$\ln(m!) < \int_1^{m+1} \ln(x) dx$

$\ln(m!) > \int_2^{m+1} \ln(x-1) dx$

4) $m! \sim \sqrt{2\pi m} \left(\frac{m}{e}\right)^m$

Odhady kombinačních čísel

1) $\left(\frac{m}{k}\right)^k \leq \binom{m}{k} \leq m^k$

a) $\binom{m}{k} = \frac{m^k}{k!} \leq m^k \leq m^k$

$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \dots (m-k+1)}{k(k-1) \dots 1}$

b) $\frac{m}{k} \geq \frac{m}{k}$, ukážíme $\frac{m-1}{k-1} \geq \frac{m}{k} \xrightarrow{\text{indukcí}} \text{by abychom ukázali} \Rightarrow \left(\frac{m}{k}\right)^k \leq \binom{m}{k}$

$\hookrightarrow mk - k \geq mk - m \Rightarrow m \geq k$ \square

2) $\left(\frac{m}{k}\right)^k \leq \binom{m}{k} \leq \left(\frac{em}{k}\right)^k$

Odhod prostředního prvků řady P. Δ

max \geq arit. průměr

1) $\frac{1}{2m+1} 4^m \leq \binom{2m}{m} \leq 4^m$

součet toho ř. je 4^m ,

$\binom{2m}{m} \geq \frac{4^m}{2m+1}$ \square


2) $\frac{4^m}{2\sqrt{m}} \leq \binom{2m}{m} \leq \frac{4^m}{\sqrt{2m}}$

• Graf


Def: Graf je (V, E) , kde V je konečná neprázdna množina vrcholů a $E \subseteq \binom{V}{2}$ je množina hran.

znáčení: Když G je graf, pak jeho vrcholy jsou $V(G)$ a hrany jsou $E(G)$


• Úplný graf - K_m - kompletní




• Prázdný graf - E_m - empty




• Cesta - P_m - path $\rightarrow P_m$ - m hran a $m+1$ vrcholů



• Kružnice - C_m - cyklus $m \geq 3$




• Úplný bipartitní graf $K_{m,m}$



• Bipartitní graf \rightarrow Def: G je bipartitní, když G je podgraf nějakého $K_{m,m}$.

Def: Graf (V, E) je bipartitní
 $\equiv \exists$ partity $L, P \subseteq V$ k.ř., $L \cup P = V$ a $L \cap P = \emptyset$ a
 $\forall e \in E: |e \cap L| = 1 \wedge |e \cap P| = 1$



Příklady:
 $\rightarrow K_3, K_4, \dots$ obsahují Δ
 $\rightarrow K_1, K_2, E_m, P_m \rightarrow$ sudé vrcholy = L a liché vrcholy = P
 $C_m \rightarrow m$ sudé, n liché nejde

Bipartitní grafy neobsahují liché cykly.

• izomorfismus grafů

Def: Grafy $G=(V,E)$ a $G'=(V',E')$ jsou izomorfní ($G \cong G'$)



$$\equiv \exists f: V \rightarrow V' \text{ l. z.}, \forall u, v \in V: \{u, v\} \in E \Leftrightarrow \{f(u), f(v)\} \in E'$$

↳ izomorfismus grafů G a G'

→ jsou izomorfní, pokud se liší pouze pojmenováním vrcholů

→ jsou izomorfní, pokud mezi V a V' \exists bijekce zachovávající vlastnost být hranou

Příklad



$G \not\cong K_5 \rightarrow |V(G)| \neq |V(K_5)|$

$G \not\cong K_6 \rightarrow |E(G)| \neq |E(K_6)|$

Poznámka: \cong je ekvivalence na libovolné množině grafů

- izomorfní grafy mají stejný počet vrcholů, hran, Δ, \dots

• # grafů na n vrcholech

- pro každou dvojici vrcholů volíme jestli je nebo není hrana $\Rightarrow \underline{2^{\binom{n}{2}}} \approx 2^{n^2}$

• # neizomorfních grafů na n vrcholech


- my tu množinu všech grafů na n vrcholech rozdělíme podle ekvivalence

\Rightarrow # ekvivalenčních tříd izomorfismu

↳ ke každému grafu \exists nejvýše $n!$ izomorfních grafů

↳ každá permutace vrcholů mi dá nějaký izomorfní graf

↳ možná některý graf dostaneme vícekrát: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 = 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$



\Rightarrow # tříd izomorfismu $\geq \frac{1}{n!} 2^{\binom{n}{2}}$

$\Rightarrow \log_2 \# \text{ tříd} \geq \binom{n}{2} - \log_2(n!) \in \Theta(n^2 - n \log n) \in \Theta(n^2)$

$\rightarrow \log_2 \# \text{ všech grafů} = \binom{n}{2} \in \Theta(n^2)$

\Rightarrow to, že nějaké grafy jsou izomorfní je zanedbatelné, protože

$\log(\# \text{ neizomorfních grafů}) \in \Theta(\log(\# \text{ všech grafů}))$

• Stupeň vrcholu

Def: Stupeň vrcholu v v grafu G : $\deg_G(v) := |\{u \in V(G) \mid uv \in E(G)\}|$
= počet hran incidentních s v .

Def: Graf G je k -regulární $\equiv \forall v \in V(G): \deg_G(v) = k$.


$\rightarrow K_n, C_n$

$\Rightarrow G$ je regulární $\equiv G$ je k -regulární pro nějaké k .

• Stoře grafu

Def: Stoře grafu je posloupnost stupňů vrcholů, nerátějí nám na pořadí.

\rightarrow grafy se stejným stoře nemají být izomorfní.

\rightarrow Stoře: 2, 2, 2, 2, 3, 3 

Lemma: V grafu $G = (V, E)$ platí $\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2 \cdot |E|$.

\uparrow princip sudosti

\rightarrow Důz: počítání konců hran dvěma způsoby.

Důsledek: Počet vrcholů lichého stupně je sudý.

• Věta o stře: Posloupnost $D = (d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n)$ pro $n \geq 2$ je stře grafu

$\Leftrightarrow 0 \leq d_n \leq n-1$ a


posloupnost $D' = (d'_1, d'_2, \dots, d'_{n-1})$ je stře grafu

$$d'_i = \begin{cases} d_{i-1}, & \text{pro } i \geq n-d_n \\ d_i, & \text{pro } i < n-d_n. \end{cases}$$

Ukázka: $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \end{pmatrix} \rightarrow 0$ • ✓

Důkaz: \Leftarrow : Necht' \exists graf G' na $V' = \{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ se stře D' t.j. $\forall i: \deg(v_i) = d'_i$.

Chci vyrobiť graf G se stře D .



\Rightarrow : Ukážeme, že mezi všemi grafy se stře D

\exists alespoň 1, pro který platí, že v_n je spojený s d_n předchozími \Rightarrow je easy.

\Rightarrow v tomto grafu budu moct odebrat poslední vrchol a dostanu G' se stře D' .

$$\mathcal{G} := \{G \mid G \text{ je graf na } \{v_1, \dots, v_n\} \text{ t.j. } \forall i: \deg(v_i) = d_i\}$$

$\hookrightarrow \mathcal{G} \neq \emptyset$ z předpokladu, že D je stře grafu.

Lemma: $\exists G \in \mathcal{G}: \forall i \in \{n-d_n, \dots, n-1\}: v_i v_n \in E(G)$.

\hookrightarrow z toho: $V(G') = V(G) \setminus \{v_n\} \Rightarrow G'$ má stře D' .
 $E(G') = E(G) \cap (V(G'))^2$

Důk: ① Pokud $d_n = n-1$, triviálně platí.


② $d_n < n-1$

Pro $G \in \mathcal{G}: j(G) := \max \{j \mid v_j v_n \in E(G)\} \Rightarrow$ Najdeme $G_* \in \mathcal{G}$, jehož $j(G)$ je největší


\Rightarrow Tvrzení: $\min \{j(G) \mid G \in \mathcal{G}\} = j(G_*) = n-d_n-1$.

\hookrightarrow pro spor předpokládáme $j(G_*) = n-d_n-1$

\Rightarrow pro E $i < j: v_i v_n \in E(G)$



\Rightarrow také $\exists k: \{v_i v_k\} \notin E(G)$ } nemůžeme to v_k je, ale
 $\{v_j v_k\} \in E(G)$ } \exists protože $d_i \leq d_j$



\hookrightarrow ten graf můžeme předělat: $V(G_\#) = V(G_*)$


$$E(G_\#) = E(G_*) \setminus \{v_i v_n, v_i v_k\} \cup \{v_j v_n, v_i v_k\}$$

$\rightarrow G_\# \in \mathcal{G} \wedge j(G_\#) < j(G_*) \Rightarrow$ SPOR \hookrightarrow

Q.E.D.

Podgrafy

Def: Graf $G'=(V',E')$ je podgrafem grafu $G=(V,E)$ $\rightarrow G' \subseteq G$
 $\equiv V' \subseteq V \wedge E' \subseteq E \cap \binom{V'}{2}$.



Def: Graf G' je indukovaným podgrafem G
 $\equiv V' \subseteq V \wedge E' = E \cap \binom{V'}{2}$.

\square je podgraf indukovaný $\{1, 2, 3, 4\}$

$\rightarrow G[V'] = (V', E \cap \binom{V'}{2})$ podgraf indukovaný množinou V' .

Cesta, kružnice, sled, tah

Def: Cesta v grafu $G: G' \subseteq G$ t. z. $G' \cong P_n$ pro nějaké n .

Kružnice v grafu $G: G' \subseteq G$ t. z. $G' \cong C_n$ \rightarrow

Nebo: Cesta je nějaká posloupnost $v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_m, v_m$, kde navzájem různé $\rightarrow \forall i: v_i \in V(G), \forall j: e_j \in E(G)$
 $\forall k: e_k = \{v_{k-1}, v_k\}$

Kružnice je posloupnost $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{m-1}, e_m, v_m$, kde navzájem různé $\rightarrow \forall i: v_i \in V(G), \forall j: e_j \in E(G)$
 $\forall k: e_k = \{v_k, v_{k+1 \pmod n}\}$

Def: Sled je zase nějaká posloupnost vrcholů a hran, kde se v_i a e_j mohou opakovat.

Def: Tah: hrany se nespojují, vrcholy mohou.

Souvislost grafu

Def: Graf G je souvislý $\equiv \forall u, v \in V(G) \exists$ cesta v G a koncovými vrcholy u, v .

Def: Relace dosažitelnosti \sim_G je relace na $V(G)$ t. z.

$u \sim v \equiv \text{v } G \exists$ cesta mezi u, v . $\rightarrow G$ je souvislý $\Leftrightarrow \sim_G$ je univerzální relace.


Lemma: Pro každý graf G je \sim_G ekvivalenční.

- $u \sim u$
- $u \sim v \Rightarrow v \sim u$
- $u \sim v \wedge v \sim w \Rightarrow u \sim w$

kdže by dvě cesty daly za sebe, tak dostanu nějaký sled \rightarrow

Lemma: Mezi vrcholy u, v vede sled \Leftrightarrow mezi u, v vede cesta. \leftarrow platí i v orient. grafech

Def: $\Leftarrow \checkmark$ \rightarrow $v_i = v_j$ pro nějaké $i < j$. \exists sled $u = v_0, e_1, v_1, \dots, e_m, v_m = v$ a $v_i = v_j$ pro nějaké $i < j$.



G myšlivím sled $v_0, e_1, v_1, \dots, e_i, v_i, e_{j+1}, \dots, e_m, v_m$.
 \rightarrow takže použijeme dohled \exists duplicitní vrcholy. \blacksquare

• Komponenty souvislosti

Def: Komponenty souvislosti grafu G jsou podgrafy indukované ekvivalenčními třídami relace dosažitelnosti \sim_G .

• Operace s grafy


• $G + v \rightarrow E' = E, V' = V \cup \{v\}$

• $G + e \rightarrow E' = E \cup \{e\}, V' = V$

• $G - e \rightarrow E' = E \setminus \{e\}, V' = V$

• $G - v \rightarrow E' = E \setminus \{e \in E \mid v \in e\}, V' = V \setminus \{v\}$ nebo $G - v = G[V \setminus \{v\}]$

• $G \% e \rightarrow$ dělení hrany $e = xy$




$G \% e = G + v - e + xv + vy$

• $G \cdot e \rightarrow$ kontrakce hrany $e = xy$

• $G(v \rightarrow z) \leftarrow$ zoprotivování hrany

$V' = V$

$E' = E \cup \{uz \mid uv \in E\}$



$G \cdot e = G + z (x \rightarrow z) (y \rightarrow z) - x - y \cong G(x \rightarrow y) - x$

• Eulerovské grafy

Def: Tah τ grafu G je Eulerovský \equiv tah obsahuje všechny vrcholy i hrany G .

tah $\begin{cases} \text{uzavřený} \\ \text{otevřený} \end{cases}$

Def: Graf je Eulerovský \equiv má uzavřený Eulerovský tah.

Věta: Graf G je Eulerovský $\Leftrightarrow G$ je souvislý a má všechny stupně sudé.

Důkaz: \Rightarrow mezi každými dvěma vrcholy vede nějaký sled \Rightarrow i cesta $\Rightarrow G$ je souvislý.

tah: $\begin{matrix} v & v \\ \text{-----} & \text{-----} \end{matrix}$ \rightarrow všechny hrany incidentní s v se dají beze zbytku rozdělit do dvojic $\Rightarrow \deg(v)$ je sudý.

\Leftarrow uzavřeme nejdelší tah τ G a ukažeme, že obsahuje všechny hrany i vrcholy \Rightarrow je Euler.

\rightarrow Necht T je jeden z nejdelších tahů τ G .

① T je uzavřený: Kdyby nebyl, tak začína v a končí w .



Tah obsahuje lichý počet hran incidentních s w .


$\Rightarrow \exists$ nějaká další hrana u incidentní s w a není na T

\Rightarrow já tuhle hranu můžu přidat k T

\Rightarrow dostanu delší tah \Rightarrow spor

② $\forall u$ vrchol na T : Pokud $uv \in E(G)$, pak $u \in T$.


Sporem:



T je nejdelší \Rightarrow je uzavřený.

Rozpojíme ho při libovolném příchodu u a na konec připojíme $uv \Rightarrow$ dostal jsem delší tah \downarrow

③ $\forall v \in V(G)$ leží na T



Sporem:

Ze souvislosti plyne, že $v \in G \exists$ cesta mezi u, v .

\rightarrow ta cesta začíná $u \in T$ a končí $v \notin T$.

\Rightarrow musí obsahovat hranu $xy: x \in T, y \notin T$.

\Rightarrow podle ② to není nejdelší tah \Rightarrow SPOB.

$\Rightarrow T$ obsahuje všechny vrcholy \Rightarrow podle 2 obsahuje i všechny hrany a podle ① je uzavřený $\Rightarrow T$ je euleroský. \blacksquare

• Orientované grafy

Def: Orientovaný graf je (V, E) , kde $E \subseteq V^2 \setminus \Delta_V$. \nearrow nedovolujeme smyčky

\hookrightarrow jsou to uspořádané dvojice

• Cesty, sledy... - fungují stejně, ale hrany na sebe musí navazovat.

• Stupně: $\deg^{\text{in}}(v) := \# u : (u, v) \in E$
 $\deg^{\text{out}}(v) := \# u : (v, u) \in E$ $\left. \vphantom{\deg^{\text{in}}(v)} \right\} \sum_{v \in V} \deg^{\text{in}}(v) = \sum_{v \in V} \deg^{\text{out}}(v) = |E|$

• Symetrizace grafu = pročkládový graf

Def: Symetrizace orientovaného grafu $G=(V, E)$ je graf $G^0=(V, E^0)$, kde

$E^0 = \{ \{u, v\} \in \binom{V}{2} \mid (u, v) \in E \vee (v, u) \in E \}$ \leftarrow zapomeneme na orientaci.

• Souvislost orientovaných grafů

Def: Graf G je

① slabě souvislý \equiv symetrizace grafu G je souvislá. $\rightarrow \leftarrow$

② Polosouvislý $\equiv \forall u, v \in V(G) \exists$ cesta $v \rightarrow u$ \vee $u \rightarrow v$. \rightarrow


③ Silně souvislý $\equiv \forall u, v \in V(G) \exists$ cesta $v \rightarrow u$. \rightarrow

Def: Relace oboustranné dosažitelnosti \approx_G je relace na $V(G)$ n.ř.

$u \approx_G v \equiv v \in G \exists$ cesta $v \rightarrow u$ $\wedge \exists$ cesta $u \rightarrow v$.

\leftarrow zase to je ekvivalence

Def: Komponenty silné souvislosti orientovaného grafu G jsou podgrafy indukované ekvivalenčními třídami \approx_G .



Eulerovské orientované grafy

Def: Orientovaný graf G je vyvážený $\equiv \forall v \in V(G): \deg_c^{in}(v) = \deg_c^{out}(v)$.


Věta: Pro orientovaný graf G je ekvivalentní:

- ① G je vyvážený a slabě souvislý
- ② G je eulerovský
- ③ G je vyvážený a silně souvislý.

Důkaz:

③ \Rightarrow ① triviálně uzavřený

② \Rightarrow ③ G obsahuje eulerovský šah $\Rightarrow \forall u, v \in G \exists$ cesta v G z u do v
 $\Rightarrow G$ je silně souvislý



\hookrightarrow do v vstupuje stejně hran jako vystupuje $\Rightarrow G$ je vyvážený.


① \Rightarrow ② Důkaz pro neorientované grafy funguje i zde.

Matice sousednosti

Def: Pro graf G s vrcholy $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ definujeme matici sousednosti

$A_G \in \mathbb{R}^{n \times n}: \forall i, j: (A_G)_{ij} = [v_i v_j \in E(G)] \Rightarrow 1$ pokud $v_i v_j$ tvoří hranu

Def: Indikátor výroku φ je $[\varphi] := \begin{cases} 1, & \text{pokud } \varphi \text{ platí,} \\ 0, & \text{pokud } \varphi \text{ neplatí.} \end{cases}$



Pozorování: Pro neorientované grafy je A_G symetrická s nulami na hlavní diagonále.

Věta: Pro $A = A_G$ grafu G na vrcholech v_1, \dots, v_n platí:

$\forall i, j: (A^k)_{ij} = \#$ sledů délky k z v_i do v_j


Důk: Indukcí podle k . Základní případ $k=1$ platí z definice A .

• Indukční krok: $k-1 \rightarrow k: A^k = A^{k-1} A$

$$(A^k)_{ij} = \sum_{\lambda=1}^n (A^{k-1})_{i\lambda} A_{\lambda j} = \sum_{\lambda: v_\lambda v_j \in E(G)} (A^{k-1})_{i\lambda} = \# \text{ sledů délky } k \text{ z } v_i \text{ do } v_j.$$

počet sledů délky $k-1$ z v_i do v_λ

$[v_\lambda v_j \in E(G)]$



Vzdálenost vrcholů

Def: Pro souvislý graf $G=(V,E)$ definujeme vzdálenost

$$d_G: V^2 \rightarrow \mathbb{R} : \forall u,v \in V: d_G(u,v) := \text{min } \# \text{ délka cesty mezi } u, v.$$

Lemma: $\forall u,v,w \in V:$

- ① $d_G(u,v) \geq 0$
 - ② $d_G(u,v) = 0 \Leftrightarrow u=v$
 - ③ $d_G(u,v) \leq d_G(u,w) + d_G(w,v)$
 - ④ $d_G(u,v) = d_G(v,u)$
- } d_G je metrika


Stromy

Def: Strom je souvislý, acyklický graf

- les je acyklický graf
- list je vrchol stupně 1.

Lemma (o listu): Každý strom s alespoň 2 vrcholy má alespoň 1 list.

Dě: Nechtě C je nejdelší cesta v tom stromě. Ukážeme, že koncové vrcholy té cesty jsou listy.



Kdyby a nebyl list, tak z a vede nějaká další hrana

- ① do $x \notin C \rightarrow$ můžeme udělat delší cestu \downarrow
- ② do $y \in C \rightarrow$ to je spor s acykličností stromu. \downarrow

Lemma: Pro graf G s listem $l: G$ je strom $\Leftrightarrow G-l$ je strom.

Dě: \Rightarrow



- $G-l$ je souvislý, protože $\forall u,v \in V(G-l) \exists$ cesta C v G mezi u, v a $C \subseteq G-l$.
- $G-l$ je acyklický, protože kdyby v $G-l$ byla kružnice, tak je i v G \downarrow

\Leftarrow

- G je souvislý, protože přidáním l nerozhijeme cesty v $G-l$ a $\forall u \in V(G) \exists$ cesta mezi u a $l \rightarrow$ jako cesta mezi u a s + hrana sl .
- G je acyklický: kdyby v G byla kružnice bez l tak je i v $G-l$ a l se nemůže účastnit kružnice, protože má stupeň 1. \square

• Eulerova formule

Věta: Pro každý strom T na n vrcholech je $|E(T)| = n - 1$.

Důkaz: Indukcí podle n .

① $n = 1$ ✓

② $n \rightarrow n + 1$: Necht T je strom na $n + 1$ vrcholech. Pak \exists list $v \in T$.

$\Rightarrow T' := T - v$ je strom na n vrcholech $\Rightarrow |E(T')| = n - 1$

$\Rightarrow |E(T)| = |E(T')| + 1 = n - 1 + 1 = n$ ▣

• Alternativní definice stromu

Věta (o charakterizaci stromu): Pro graf G jsou násled. tvrzení ekvivalentní:

- ① G je souvislý a acyklický.
- ② G je jednoznačně souvislý $\equiv \forall u, v \in V(G) \exists!$ cesta ν G mezi u, v .
- ③ G je minimálně souvislý $\equiv G$ je souvislý a $\forall e \in E(G): G - e$ není souvislý.
- ④ G je maximálně acyklický $\equiv G$ je acyklický a $\forall e \in \binom{V(G)}{2} \setminus E(G): G + e$ má cyklus.
- ⑤ G je souvislý a $|E(G)| = |V(G)| - 1$.

Důkaz:



① \Rightarrow ②: Indukcí otehráváním listů:

$G - l$ je strom $\Rightarrow G - l$ je 1-značně souvislý $\Rightarrow G$ je 1-značně souvislý.

① \Rightarrow ③: Indukcí: $G - l$ je strom $\Rightarrow G - l$ je min. souv. $\Rightarrow G$ je min. souv.

① \Rightarrow ④: Indukcí: G je max. acykl. $\because G - l$ je max. acykl. a přidáním hrany s, l by vznikla kruž.

① \Rightarrow ⑤: Stromy jsou souvislé a platí pro ně Eulerova formule.

• Implikace ② \Rightarrow ①, ③ \Rightarrow ①, ④ \Rightarrow ① dokážeme obměnou.

\neg ① \Rightarrow \neg ②: G buď není souvislý v obsahuje kružnici \Rightarrow není 1-značně souvislý.

\neg ① \Rightarrow \neg ③: G buď není souvislý v obsahuje kružnici \Rightarrow není minimálně souvislý.

\neg ① \Rightarrow \neg ④: Když není acyklický, tak není max. acykl. a když není souvislý, tak můžeme spojit koncov.

⑤ \Rightarrow ④: $|E(T)| = n - 1 \Rightarrow \sum_v \deg(v) = 2n - 2 < 2n \Rightarrow \exists v: \deg(v) < 2 \Rightarrow$ pro $n \geq 2 \exists$ list.

Indukcí otehráváním listů

① $n = 1$ ✓

② $n \rightarrow n + 1$: G na $n + 1$ vrcholech splňuje ⑤. \exists list $v \in G$.

$G - l$ také splňuje ⑤ a podle i.p. $G - l$ je strom

$\Rightarrow G$ je také strom. ▣

Kostra grafu

Def: Kostra grafu G je $K \subseteq G$ t.č. K je strom a $V(K) = V(G)$.

Lemma: G má kostru $\Leftrightarrow G$ je souvislý

Důk: \Rightarrow triviálně

\Leftarrow dočud v G jsou kružnice, tak můžeme hrany na nich \rightarrow natonec dostaneme strom.

Rovinné grafy

Def: Oblouk (křivka) je podmnožina roviny $\gamma = \{f(t) \mid t \in [0,1]\}$, kde $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ je prostá spojitá funkce. Body $f(0)$ a $f(1)$ jsou koncové body oblouku γ .

Def: Rovinné natreslení grafu G je přiřazení různých bodů v rovině různým vrcholům G spolu s přiřazením oblouků každé hraně G t.č. žádné dva oblouky nesdílejí stejný bod v rovině - jedinec ten koncový.



Def: Graf je rovinný, pokud má alespoň jedno rovinné natreslení.


Def: Stěny natreslení jsou části roviny uzavřené oblouky natreslení a vnější stěna.



Pozorování: Hranice stěny souvislého grafu je natreslení uzavřeného sledu.

Věta (Jordanova): Každá uzavřená křivka v rovině dělí rovinu na 2 části - vnější a vnitřní.

Příklad: K_5 není rovinná.




\Rightarrow 4 může být buď vnitřní nebo venku

\hookrightarrow vnitřní, pro venek by to bylo obdobné

\hookrightarrow kde je 5? Kde ji dáš nemůžeme - musela by přebrojit nějakou uzavřenou křivku

\rightarrow kružnice (4-2-3) \rightarrow 5 je vnitřní
1 je venku

$K_{3,3}$ není rovinná



c je vnitřní b 3 a 2
1 je venku

Pokud graf obsahuje K_5 nebo $K_{3,3}$ nebo nějaké jejich dělení, tak není rovinný.


Věta (Kuratowského): Graf G je nerovinný \Leftrightarrow obsahuje podgraf izomorfní s dělením K_5 nebo $K_{3,3}$.

\hookrightarrow K_5 a $K_{3,3}$ jsou jediné překážky rovinnosti.

\rightarrow zda je graf rovinný lze rozhodnout v $O(|V| + |E|)$

• Kreslení na sféru

→ použijeme stereografickou projekci



→ obraz libovolného bodu kromě S najdeme pomocí polopřímky vystřelené z S.

→ S se zobrazí sám na sebe

→ S nemá obraz

⇒ Spojitá bijekce mezi $\mathcal{Y} \setminus \{S\}$ a \mathbb{R}^2

→ Hranice vnější stěny se mi protíná na kružnici na sféře, která obsahuje S.

→ Já tu sféru můžu potočit tak, aby S byl uvnitř jiné stěny

⇒ dostal jsem nějaké jiné nakreslení téhož grafu

⇒ vnější stěnu lze zvolit

• Operace zachovávající rovinnost

$$G - v, G - e, G + v \checkmark$$

$$G + e ?$$

$$G \circ e \checkmark$$

$$G \cdot e \checkmark$$



→ Existuje ϵ okolí toho oblouku uv , kterým mohou protáhnout ty hrany co vedou do v k u .

• Eulerova formule

Věta: Necht' G je souvislý graf nakreslený do roviny,

$$v := |V(G)|, e := |E(G)|, f := \# \text{ stěn nakreslení. Potom } \underline{v + f = e + 2}$$

Důkaz: Zvolíme v pevně, poč. indukci podle e .

$$\rightarrow e = v - 1$$

① G má být souvislý \rightarrow zvolíme minimální souvislý graf (strom) $\Rightarrow v + 1 = e + 2 \checkmark$

② $e - 1 \rightarrow e$: máme graf G s $e + 1$ hranami $\rightarrow G$ už není strom

\Rightarrow necht' x je hrana na kružnici v G

$$\Rightarrow G' := G - x \Rightarrow v' = v, e' = e - 1, f' = f - 1$$

podle Jordanovy věty ta hrana odděluje 2 stěny

\Rightarrow pro G' věta platí podle indukčního předpokladu

$$\Rightarrow v' + f' = e' + 2 \Rightarrow v + f - 1 = e - 1 + 2 \Rightarrow v + f = e + 2 \quad \blacksquare$$

• Rovinné grafy s lomenými čarami a úsečkami místo oblouků

→ zajímavé je, že množina rovinných grafů se nijak nemění

Maximální rovinné grafy


Def: Graf G je maximální rovinný $\equiv G$ je rovinný a $G+e$ není rovinný pro $\forall e \in \binom{V(G)}{2} \setminus E(G)$

Příklady: K_3, K_4 jsou max. rovinné \because do nich nejde přidat hrany.
 $K_{3,3}-e, K_5-e$ jsou max. rovinné pro libovolnou hranu e .

Pozorování: Je-li G max. rovinný s alespoň 3 vrcholy, pak ve všech jeho naryskování jsou všechny stěny trojúhelníkové.




Dě: ① G je souvislý, řadyby nebyl...



② Je-li hranicí stěny kružnice, pak je to \rightarrow

③ Co řadyby hranicí stěny nebyla kružnice?
 \rightarrow hranicí stěny obecně je nejdelší uzavřený sled



\rightarrow vezmu nejdelší vrchol v , který se v tom sledu opakuje.
 \rightarrow řadybych ten v odstraním, což se mi ten sled rozpadne na alespoň 2 komponenty
 \hookrightarrow můžu si vzít nějaké 2 vrcholy na různých komponentách a spojit je. ζ

Def: Graf, jehož naryskování má všechny stěny \triangle se nazývá rovinná triangulace.

Pozorování: Pro triangulaci na n vrcholech platí $e = 3n - 6$.

Dě: Budu počítat strany hran dvěma způsoby:

$$2e = 3f \Rightarrow n + \frac{2}{3}e = e + 2 \Rightarrow e = 3n - 6$$

Důsledek: V každém rovinném grafu s alespoň 3 vrcholy platí $e \leq 3n - 6$.

• Průměrný stupeň vrcholu v rovinném grafu < 6

$$\because \sum_{u \in V} \deg(u) = 2e \leq 6n - 12 < 6n$$

\Rightarrow každém rovinném grafu $\exists u \in V: \deg(u) \leq 5$ \rightarrow něco podobného jako list



• K_5 není rovinná

$$\because n = 5, e = \binom{5}{2} = 10 \Rightarrow 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9 \quad \zeta$$

\rightarrow vrchol stupně nejvýš 5.

! Pozor, to že graf splňuje $e \leq 3n - 6 \not\Rightarrow$ že je rovinný - např. $K_{3,3}$.

Rovinné grafy bez Δ

- Maximální rovinné \rightarrow jejich stěny budou  nebo 
- \rightarrow bavíme se o grafech na alespoň 4 vrcholech

① stěny jsou \square a \pentagon \rightarrow počítám strany hran

\rightarrow edgby jen \square : $2e = 4f$

\rightarrow edgě i \pentagon : $2e \geq 4f \Rightarrow v + f = e + 2 \Rightarrow e = v + f - 2$

$$6f \leq \frac{1}{2}e \Rightarrow e \leq v + \frac{1}{2}e - 2 \Rightarrow \underline{\underline{e \leq 2v - 4}}$$

② ten graf je ta hvězdička

\rightarrow je to strom $\Rightarrow e = v - 1 \Rightarrow v - 1 \leq 2v - 4 \Rightarrow v \geq 3 \checkmark$

③ důsledky

• průměrný stupeň $< 4 \quad \because \sum_u \deg(u) \leq 4v - 8 < 4v$

• $\exists u \in V: \deg(u) \leq 3$

• $K_{3,3}$ není rovinná $\because v = 6, e = 3 \cdot 3 = 9 \Rightarrow 9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 8 \quad \downarrow$


Barvení map

- \rightarrow sousední státy (státy, které mají více než 1 společný bod) musí mít různé barvy
- \rightarrow je dokázáno, že stačí 4 barvy


• Převod pomocí duality na barvení rovinných grafů

\rightarrow mapu převedeme na rovinný graf G , s $V(G) :=$ státy a $uv \in E(G) \Leftrightarrow u, v$ mají netriviální společnou hranici.

mapa $\xrightarrow{\text{dualita}}$ rovinný graf.



\rightarrow ten graf je rovinný, protože každá hrana vede z jedné stěny přes hranici do druhé stěny

\rightarrow z každého vrcholu povedu oblouky do hranic se sousedními státy, což jsou hvězdičky , které jsou rovinné.

\rightarrow teď jen stačí spojit konce těch oblouků na společných hranicích.

\rightarrow edgě vrcholy nahradíme stěnami a stěny vrcholy, což dostaneme tzv. duální graf

• Barvení grafů

Def: Obarvení grafu G & barvami je $c: V(G) \rightarrow [k]$ t.j. $\forall xy \in E(G): c(x) \neq c(y)$.


Def: Barvnost (chromatické číslo) grafu G je $\chi(G) := \min \{k \mid G \text{ má obarvení } k \text{ barvami}\}$

Příklady

$$\chi(E_n) = 1, \chi(K_n) = n, \chi(P_n) = 2, \chi(K_{m,m}) = 2, \chi(C_n) = \begin{cases} 2 & n \text{ - sudé} \\ 3 & n \text{ - liché} \end{cases}$$

Prozornání: $\chi(G) \leq 2 \Leftrightarrow G$ je bipartitní.


Dz: \Leftarrow obě partity obarvíme dvěma různými barvami



\Rightarrow do partit rozdělíme vrcholy podle barvy

tvrzení: Každý strom je 2-obarvitelný \Rightarrow je bipartitní

Dz #1:



Strom zakořeníme a vrcholy rozdělíme do vrstev \rightarrow poř. je obarvíme podle parity


$$c(x) = d(r, x) \bmod 2 + 1 \quad \square$$

Dz #2: Indukcí podle $n = |V(T)|$

① $n=1 \checkmark$

② $n-1 \rightarrow n$: Necht' l je list, s jeho soused.

$$G' := G - l \xrightarrow{\text{I.P.}} \exists c' \text{ obarvení } G' \Rightarrow c(r) := \begin{cases} 3 - c'(s), & r = l \\ c'(r), & r \neq l \end{cases}$$



Prozornání: Pokud $H \subseteq G$, pak $\chi(H) \leq \chi(G)$.

Věta: $\chi(G) \leq 2 \Leftrightarrow G$ nemá lichou kružnici. ($\Leftrightarrow G$ je bipartitní)

Dz: \Rightarrow obrácenou: G má lich. k. $\Rightarrow \chi(G) \geq 3$. \checkmark

\Leftarrow ① Kdyby G byl nesouvislý: obarvíme po komponentách.

② Necht' $K :=$ kostra grafu G , pak $\exists c: V(G) \rightarrow \{1, 2\}$ obarvení K .


Tobto obarvení je korektní pro celý graf G . Kdyby ne:

$$\exists xy \in E(G) \setminus E(K) \wedge c(x) = c(y)$$

$\rightarrow K$ je strom \Rightarrow mezi $x, y \exists!$ cesta C v K

\rightarrow na C se barvy střídají a její koncové body mají stejnou barvu

$\Rightarrow C$ má sudou délku $\Rightarrow C + xy$ je lichá kružnice v $G \downarrow$



Barvení rovinných grafů

Def: Pro graf G definujeme:

① $\Delta(G) = \max \{ \deg(v) \mid v \in V(G) \}$

② $\delta(G) = \min \{ \deg(v) \mid v \in V(G) \}$

↗ Každý podgraf G obsahuje vrchol stupně $\leq \delta$.


Def: Graf G je δ -degenerovaný $\equiv \forall H \subseteq G \exists v \in V(H) : \deg_H(v) \leq \delta$

① $\Leftrightarrow \max \{ \delta(H) \mid H \subseteq G \} \leq \delta$.

② $\Leftrightarrow \exists \leftarrow$ lineární uspořádání na $V(G)$ t.j.

$\forall v \in V(G) : |\{u < v \mid uv \in E(G)\}| \leq \delta$.

→ v tom grafu vždy $\exists v \in V : \deg(v) \leq \delta \Rightarrow$ urobíme ho a dáme ho na prímku doprava \Rightarrow složky zpočátku a další vrcholy dáváme nalevo od něj \Rightarrow ty vrcholy nalevo jsou $<$ než ty napravo



→ možná tam jsou i nějaké hrany doprava, ale ty nás nerajímají

Průklady: Stromy \rightarrow 1-deg $\rightarrow \chi \leq 2$

Rovinné \rightarrow 5-deg $\rightarrow \chi \leq 6$

Rovinné bez $\Delta \rightarrow$ 3-deg $\rightarrow \chi \leq 4$

Libovolný $G \rightarrow \Delta(G)$ -deg $\rightarrow \chi \leq \Delta(G) + 1$

↗ stačí 6 barev

Tvrzení: Necht G je δ -degenerovaný. Pak $\chi(G) \leq \delta + 1$.

Dě: Ty vrcholy si uspořádám podle \leftarrow a budu je barvit zleva.

Pro \forall další vrchol je zaručeno nejvýše δ barev \Rightarrow stačí mi jich $\delta + 1$.


• Věta (o 5 barvách): Pro G rovinný je $\chi(G) \leq 5$.

Dě#1: Indukcí podle $n := |V(G)|$.

① Pro $n \leq 5$ triviální.

② $n-1 \rightarrow n$. Necht v je vrchol s $\min \deg(v) \rightarrow \deg(v) \leq 5$.

$G' := G - v \xrightarrow{IP} \exists c'$ 5-obarvení $G' \rightarrow v$ tam vrátíme zpět a chceme najít obarvení c .




- a) Pokud sousedé v mají v c' max 4 různé barvy \Rightarrow dobarvíme v v c .
- b) v má 5 sousedů a všichni mají různé barvy v c' .

$A :=$ podgraf indukovaný vrcholy, do kterých vede cesta e a přes vrcholy s $c(a)$ nebo $c(c)$.

• požad $c \notin A$: v A prohodíme barvy $\Rightarrow c(a) = c'(c), c(v) = c'(a)$

• požad $c \in A$: Prohozením barev by mi nepomohlo \Rightarrow udělám stejný trik s b, d .




\hookrightarrow udělám podobný podgraf z b přes vrcholy s $c(b)$ a $c(d)$.
 \Rightarrow získáme podgraf B , $d \notin B$ z bodanový vrcholy o brvení.
 \Rightarrow prohodíme barvy v $B \Rightarrow c(b) = c'(d), c(v) = c'(b)$. \blacksquare

Dě #2: Zase indukci podle n . ① stejné.

② Požad \exists vrchol v s $\deg(v) \leq 4 \rightarrow$ dáme mu sbyvajícím barvu.

Jinak: zvolíme vrchol v stupně 5. G je rovinný $\Rightarrow K_5 \notin G \Rightarrow$

$\exists x, y$ sousedi v t.č. $xy \notin E(G)$.



$\Rightarrow G' := G - x - y - v \rightarrow$ vrcholy x, y, v jsou nahrazeny w .

$\hookrightarrow G'$ je rovinný $\xrightarrow{IP} \exists c'$ obarvení G' .

$\Rightarrow c(x) = c(y) = c'(w)$

$\Rightarrow c(v) = i \in [5] \setminus \{c'(w), c'(a), c'(b), c'(c)\}$

\hookrightarrow sbyvajícím barva \blacksquare

• Klikařost grafu

Def: Klikařost grafu G je $\chi(G) := \max. \{k : \exists H \subseteq G : H \cong K_k\}$.

Pozorování: Pro graf G platí: $\chi(G) \geq \mathcal{H}(G)$.

\hookrightarrow protože $\chi(K_2) = 2$.

• Pravděpodobnostní prostor

→ skládá se ze 3 objektů → Ω = množina el. jevů

↳ $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ = množina jevů

↳ $P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ = pravděpodobnost

• Diskrétní pp. prostor

Def: Diskrétní pp. p. je (Ω, \mathcal{F}, P) , kde

• Ω je konečná nebo spočetná množina el. jevů ↗ všechny možné výsledky nějakého náhodného jevu.

• $\mathcal{F} = 2^\Omega$ → jev je také možné popsat logickou formulí } $J = \{x \in \Omega \mid \varphi(x) \text{ platí}\}$

• $P: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$ je pravděpodobnostní funkce. ↗ $P(A)$ množina
↳ $P[\varphi]$ logická formule

→ Plat. každého jevu navíc splňuje:

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) \Rightarrow P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1.$$

→ pp. p. je konečný $\equiv \Omega$ je konečná

→ konečný pp. p. je klasický $\equiv \forall \omega \in \Omega: P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|} \Rightarrow P(J) = \frac{|J|}{|\Omega|}$

Příklady

• n hodů mincí: $\Omega = \{0,1\}^n$ ↗ z.m., $P(\{\omega\}) = 2^{-n}$.

• Bertrandův paradox: kartičky 11, 00, 01.

→ vybereme náh. kartičku a položíme ji náhodnou stranou na stůl.

→ horní strana je 1.

→ $P[\text{dolní strana je 1}] = ?$

$\Omega = \{11, 11, \cancel{00}, \cancel{00}, 01, \cancel{01}\}$ ↗ 1 = dolní je 1

$J = \{11, 11\}$

↳ $\Omega' = \{11, 11, 01\}$


$$\Rightarrow P = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow P[A|B] = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3}$$

• Podmíněná pravděpodobnost

Def: Podmíněná pod. jev A za předpokladu, že nastal jev B, $P(B) \neq 0$ je

$$P[A|B] := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



Pravděpodobnost sjednocení

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ pro $A \cap B = \emptyset$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$

← princip inkluze a exkluze

Věta (o úplné pravděpodobnosti):

Nechť A je jev a B_1, \dots, B_m rozklad Ω na jevy t.j. $\forall i P(B_i) > 0$. Potom:

$P(A) = \sum_i P[A|B_i] \cdot P(B_i)$

← vždy jevík z A kam
někde je! jednan.

Dů: Víme, že $\{A \cap B_i\}$ jsou dvěma disjunktívní množiny $\Rightarrow \bigcup_i A \cap B_i = A$

$\Rightarrow P(A) = P(\bigcup_i A \cap B_i) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P[A|B_i] P(B_i)$ \square

Speciálně: $P(A) = P[A|B]P(B) + P[A|\bar{B}]P(\bar{B})$.

Řetězové pravidlo: $P(A \cap B \cap C) = P[A|B \cap C] \cdot P(B \cap C) = P[A|B \cap C] \cdot P[B|C] \cdot P(C)$.

Příklad: Test na nemoc, známe: $P[T|N]$, $P[T|\bar{N}]$, $P(N) \rightarrow P[N|T] = ?$

$$P[N|T] = \frac{P(N \cap T)}{P(T)} = \frac{P(T \cap N)}{P(T)} = \frac{P[T|N] \cdot P(N)}{P(T)} = \frac{P[T|N] \cdot P(N)}{P[T|N] \cdot P(N) + P[T|\bar{N}] \cdot P(\bar{N})}$$

Věta (Bayesova): Nechť A je s $P(A) > 0$ a B_1, \dots, B_m rozklad Ω na jevy t.j. $\forall i P(B_i) > 0$:

$$P[B_i|A] = P[A|B_i] \cdot \frac{P(B_i)}{\sum_j P[A|B_j] \cdot P(B_j)} = \frac{P[A|B_i] P(B_i)}{P(A)}$$

Nezávislost jeví

$\hookrightarrow P[A|B] = P(B)$

Def: Jevy A, B jsou nezávislé $\equiv P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \equiv P(B) = 0 \vee P[A|B] = P(A)$.

Def: Jevy A_1, \dots, A_m jsou

• pro 2 nezávislé $\equiv \forall i, j: P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$

• pro k nezávislé $\equiv \forall I \in \binom{[m]}{k}: P(\bigcap_{i \in I} A_i) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

• vzájemně nezávislé $\equiv \forall k \geq 2$ jsou pro k nezávislé.

Příklad: Jevy, které jsou pro 2 nezávislé, ale pro 3 ne ne.

$\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$, P klasická

$A = \{10, 11\}$ první 1

$B = \{01, 11\}$ druhá 1

$C = \{00, 11\}$ sudý #1

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4} \checkmark$

$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} \times$

Příklad: Micháim šarot $\Omega = \{\pi \mid \pi \text{ je permutace na } [32]\}$

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{32!}$$

$$\left. \begin{aligned} A &= \{\pi \mid \pi(1) = 1\} & P(A) &= \frac{31!}{32!} = \frac{1}{32} \\ B &= \{\pi \mid \pi(2) = 2\} & P(B) &= \frac{1}{32} \end{aligned} \right\} P(A \cap B) = \frac{30!}{32!} = \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{31} \neq \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{32}$$

• Součin pp. prostou

Def: Součin pp $(\Omega_1, 2^{\Omega_1}, P_1)$ a $(\Omega_2, 2^{\Omega_2}, P_2)$ je $(\Omega_1 \times \Omega_2, 2^{\Omega_1 \times \Omega_2}, P)$, kde

$$\forall A \subseteq \Omega_1 \times \Omega_2: P(A) := \sum_{(\omega_1, \omega_2) \in A} P_1(\{\omega_1\}) \cdot P_2(\{\omega_2\})$$

viacem: $P(\Omega_1 \times \Omega_2) = 1$.

$$P(\Omega_1 \times \Omega_2) = \sum_{(a_1, a_2) \in \Omega} P(\{a_1\}) P(\{a_2\}) = \sum_{a_1 \in \Omega_1} P(\{a_1\}) \cdot \sum_{a_2 \in \Omega_2} P(\{a_2\}) = \sum_{a_1 \in \Omega_1} P(\{a_1\}) = 1$$

$$\forall \omega = (\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2: P(\omega) = P_1(\{\omega_1\}) \cdot P_2(\{\omega_2\})$$

→ Aby jery bze vnímat jako body v rovině, jejich projekci na souř. osy můžeme separovat jejich složky. → hod mince a hod kostek.

→ Pokud jery A_1 v součinu pp závisí jen na první složce (podla 1 na minci) a jery A_2 závisí jen na druhé složce (podla 3 na kostce), pak jsou A_1, A_2 nezávislé.

Příklad: $\Omega = \{0, 1\}^n$, $P(\{1\}) = p$ → pokus s psi úspěšm p

→ součinem n těchto pp získáme posloupnost n nezávislých pokusů.

Je-li $\omega \in \{0, 1\}^n$ s k jednotkami, máme $P(\{\omega\}) = p^k (1-p)^{n-k}$.

• Náhodné veličiny

Def: Náhodná veličina je funkce, která číselně ohodnocuje el. jery $x: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Př: hodíme n-krát minci, $x := \#1 \Rightarrow P[X < 3] \rightarrow [X < 3]$ má vícero možných jery.

Def: Střední hodnota n.v. X je $E[X] := \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) P(\{\omega\})$.

→ v klasickém pp je $E[X] = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \leftarrow \text{A.P.}$
 → v nekonečném pp nemusí existovat

Věta (o linearity s. h.): Nechtě X, Y jsou n.v. a $\lambda \in \mathbb{R}$, potom:

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \text{ a } E[\lambda X] = \lambda E[X].$$

Dz: $E[X + Y] = \sum_{\omega \in \Omega} (X + Y)(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) P(\{\omega\}) + Y(\omega) P(\{\omega\})) = E[X] + E[Y]$.

Příklad: hodíme n -krát mincí, $X = \#1 \dots E[X] = ?$

$X_i := [\text{na } i\text{-té pozici je } 1] \rightarrow \text{indikátor vývozu (jevo)} \quad X_i = \#1 \text{ na } i\text{-té pozici}$

$$X = \sum_i X_i \Rightarrow E[X] = E\left[\sum_i X_i\right] \stackrel{\text{lin}}{=} \sum_i E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \underline{\underline{\frac{1}{2}n}}$$

$$\forall i: E[X_i] = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \rightarrow$$

Počítání indikátorů k výpočtu střední hodnoty

Def: Indikátorem jevo J je n.v. $X := \begin{cases} 0 \\ 1, \text{ nastal-li jevo } J. \end{cases}$

Obecně: Mějme jevy J_1, \dots, J_n , jejich indikátory X_1, \dots, X_n
a n.v. $X := \# \text{ jevů, které nastaly.}$


$$\forall i: E[X_i] = 0 \cdot P(J_i) + 1 \cdot P(J_i) = P(J_i)$$

$$\Rightarrow E[X] = \sum_i E[X_i] = \sum_i P(J_i)$$

\Rightarrow kdykoli máme nějakou n.v. $X = \# \text{ jevů nějakého druhu, které nastaly,}$
poč umíme určit $E[X]$ pomocí indikátorů

Př: Dokaž, že každý graf $G=(V,E)$ má bipartitní podgraf s alespoň $\frac{1}{2}|E|$ hranami.

\rightarrow Náhodně rozdělíme vrcholy na dvě části $\rightarrow X := \# \text{ hran polorci napříč}$



$$X_e := \begin{cases} 0 \\ 1, \text{ pokud } e \text{ vede napříč} \end{cases}$$

$$E[X] = \sum_e E[X_e] = \sum_e \frac{1}{2} = \frac{1}{2}|E|$$

\hookrightarrow průměr \leq max

$$L \cap P = \emptyset, L \cup P = V$$


$$P[e \text{ vede napříč}] = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow \text{na } [n]$$

Př: Náhodná perm. π . i je levé max $\equiv \forall j < i: \pi(j) < \pi(i)$. $X := \# \text{ levých maxim}$

$$\Rightarrow E[X] = ? \quad X_i := \begin{cases} 0 \\ 1, i \text{ je levé max} \end{cases}$$

$$\rightarrow P[X_i = 1] = \frac{1}{i}$$



\nearrow z 5 čísel má
nejvyšší $\pi(i)$ největší

$$\rightarrow E[X] = \sum_i E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \approx \underline{\underline{\ln(n)}}$$

• Rozdělení náhodné veličiny

Def: Rozdělení n.v. X je funkce $Q: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ t. z.

$$Q(a) := P[X=a] = \sum_{\substack{\omega \in \Omega, \\ X(\omega)=a}} P(\{\omega\})$$

Podrobní: $E[X] = \sum_{a \in \mathbb{R}} a \cdot Q(a)$.

Dů: $E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{a \in \mathbb{R}} \sum_{\substack{\omega \in \Omega, \\ X(\omega)=a}} a \cdot P(\{\omega\}) = \sum_{a \in \mathbb{R}} a \cdot \sum_{\substack{\omega \in \Omega, \\ X(\omega)=a}} P(\{\omega\}) = \sum_{a \in \mathbb{R}} a \cdot Q(a)$ □

• Věta (Markovova nerovnost): Je-li $X \geq 0$ n.v. a $k > 0$, potom

$$P[X \geq k \cdot E[X]] \leq \frac{1}{k} \quad \leftarrow \text{jet. že } X \text{ bude násobně větší než } E[X] \text{ je malá.}$$

Důkaz: $P[X \geq k \cdot E[X]] = \sum_{\substack{\omega \in \Omega, \\ X(\omega) \geq k \cdot E[X]}} P(\omega) \leq \sum_{\substack{\omega \in \Omega, \\ X(\omega) \geq k \cdot E[X]}} P(\omega) \cdot \frac{X(\omega)}{k \cdot E[X]} \leq \sum_{\omega \in \Omega} \frac{P(\omega) \cdot X(\omega)}{k \cdot E[X]} = \frac{1}{k}$

Příklad: Znovu rozdělujeme grafy \rightarrow chceme najít bip. podgraf s alespoň $\frac{49}{200}$ hranami.

\hookrightarrow Provádíme náhodné řezy ... $P[\text{úspěch}] = ?$

$$P[\text{neúspěch}] = \left[\# \text{ hran uvnitř} \geq \frac{51}{200} |E| \right] = \left[\# \text{ hran uvnitř} \geq \frac{51}{50} E \right] \leq \frac{50}{51}$$

$E[\downarrow] = \frac{1}{2}|E|$

$$P[\text{úspěch}] = 1 - P[\text{neúspěch}] \geq 1 - \frac{50}{51} = \frac{1}{51} \rightarrow \text{průměrně stačí 51 pokusů}$$

• Erdősovo-Szekeresova lemma o monotónních posloupnostech

Věta: V každé posloupnosti n^2+1 různých čísel existuje monotónní podposloupnost délky $n+1$.

Def: Posloupnost je uspořádaná k -tice (x_1, x_2, \dots, x_k) . Podposloupnost délky m je určena indexy $i(1), i(2), \dots, i(m)$, kde $i(1) < i(2) < \dots < i(m)$ a je tvořena prvky $x_{i(1)}, x_{i(2)}, \dots, x_{i(m)}$.

Dů: Máme posloupnost $(x_1, x_2, \dots, x_{n^2+1})$. Definujeme relaci \leq na $\{1, 2, \dots, n^2+1\}$:

$$i \leq j \equiv i < j \wedge x_i \leq x_j. \text{ Všimneme si, že } \leq \text{ je uspořádání.}$$

\rightarrow řetězce tohoto uspořádání jsou rostoucí podposloupnosti

\rightarrow antiřetězce jsou klesající

Z věty o délce a šířce: $d \cdot w \geq n^2+1 \Rightarrow d \geq n+1$ nebo $w \geq n+1$
jinak $d \cdot w \leq n^2$ □

De Bruijnovy posloupnosti

Chceme sestavit cyklickou posloupnost čísel (x_1, x_2, \dots, x_m) t.j. $\in \{0,1\}$

se v ní vyskytuje každá k -prvková posloupnost nul a jedniček - po sobě jdoucích.

$\Rightarrow \forall a \in \{0,1\}^k$ se vyskytuje jako podřetivec.

Zjevně $m \geq 2^k$ (2^k různých řetězců) \rightarrow představivě 2^k stanic.
de Bruijnova posl.

Tvrzení: Pro každé $k \geq 1$ \exists de Bruijnova posl.

Důk: Konstrukce pomocí euklidských stahů.


\Rightarrow Sestrojíme orientovaný graf $G=(V,E)$, kde

$V := \{0,1\}^{k-1} \rightarrow |V| = 2^{k-1}$



$E :=$ množina všech dvojic tvaru $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}), (a_2, a_3, \dots, a_{k-1}, 0)$,
 $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1}), (a_2, a_3, \dots, a_{k-1}, 1)$.

\rightarrow pro $k=3$:



Pozorování: G je euklidský

$\because \forall v \in V: \deg_G^{out}(v) = 2$

z def. $0,0011, 1,0011$

$\forall v \in V: \deg_G^{in}(v) = 2$


$v: 0,0110$

G je silně souvislý

$k-1$ prvkové oběhů

\Rightarrow z a do b \exists sled

\Rightarrow z a do b \exists cesta



$\Rightarrow \forall v \in G \exists$ euklidský stah


\Rightarrow Za každou hranu v tom euklidském stahu započítám 0 nebo 1 podle toho, v jaké smyčce \rightarrow toto posl. je de Bruijnova

00111010

Důk: chceme najít nějakou k -tici v tom stahu

$(a_1, a_2, \dots, a_k) \rightarrow$ končíme se na $(a_1, a_2, \dots, a_{k-1})$

\Rightarrow to je vchod v $G \Rightarrow$ na tom stahu je právě dvojnásob.



\rightarrow do toho vchodu jsme se dostali

postupným přiřizováním jeho bitů na konec

\rightarrow ten vchod je tam 2x, za ním je 0 a 1 \rightarrow doplním na k -tici.




• Platónská tělesa

Def: Platónské těleso je pravidelný mnohostěn, což je trojrozměrné konvexní těleso, ohraničené konečným počtem stěn - shodných pravidelných n -úhelníků, jejichž se v každém vrcholu setkává stejný počet.

Věta: Platónských těles je právě 5 a sice: pravidelné 4, 6, 8, 12, 20-stěny.
 $\triangle \square \triangle \diamond \triangle$

Dů: Ukážeme, že jiná platónská tělesa nemohou existovat.

↳ Nejprve zvolíme množinu opiseme sféru a poté její pomocí stereografické projekce převedeme na rovinný graf. Např.:



$d :=$ stupeň každého vrcholu = # n -úhelníků
 v něm se setkávají

$k :=$ # vrcholů na každé stěně

12-stěn: $d=3, k=5$

20-stěn: $d=5, k=3$

Pozorování: $d \geq 3, k \geq 3$.

$f :=$ # stěn, $e := |E| \Rightarrow$ počítáme strany hran dvěma způsoby:
 $v := |V|$

$$2e = f \cdot k, \quad 2e = \sum_{v \in V} \deg(v) = v \cdot d$$

$$\Rightarrow f = \frac{2e}{k}, \quad v = \frac{2e}{d}$$

$$\Rightarrow v + f = e + 2 \Rightarrow \frac{2e}{d} + \frac{2e}{k} = e + 2 \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow d=3 \text{ nebo } k=3, \text{ jinak } \frac{1}{d} + \frac{1}{k} \leq \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{1} d=3: \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3} > 0 \Rightarrow k \in \{3, 4, 5\}$$

$$\textcircled{2} k=3: \frac{1}{d} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2} > 0 \Rightarrow d \in \{3, 4, 5\}$$

\Rightarrow máme 6 možností, ale $d=3 \rightarrow k=3$ a $k=3 \rightarrow d=3$ je to stejné

\Rightarrow 5 možností pro 5 platónských těles. ▣

• Rětežce a antiretežce

$\omega(X, \leq) := \max. \text{ř. délka řetězce ("výška" usř.)}$

$\alpha(X, \leq) := \max. \text{ř. délka antiretežce ("šířka" usř.)}$

• Věta (o hloubkém a širokém): $\forall (X, \leq)$ ČOM platí $\alpha(X, \leq) \cdot \omega(X, \leq) \geq |X|$.

↳ form: požad $|X| = n$, pož $\alpha \geq \sqrt{n}$ nebo $\omega \geq \sqrt{n}$.

Důkaz: Tu množinu X rozdělíme na vrstvy X_1, \dots, X_k :

$X_1 := \{x \in X \mid x \text{ je minimální}\}$.

→ Když máme X_1, \dots, X_i : $Z_i := X \setminus \bigcup_{j=1}^i X_j \rightarrow$ požad $Z_i \neq \emptyset$ protože

↳ $Z_i \neq \emptyset$: $X_{i+1} := \{x \in Z_i \mid x \text{ je min. v } Z_i\}$.

→ naonec získáme nějaký rozklad X : $\{X_1, \dots, X_k\} \Rightarrow \sum_i |X_i| = |X|$

→ $\forall i$: X_i je antiretežce $\Rightarrow |X_i| \leq \alpha$

→ $\exists \pi_1 \in X_1, \dots, \pi_k \in X_k$: $\{\pi_1, \dots, \pi_k\}$ je řetězec $\Rightarrow k = \omega$

↳ $\pi_k \in X_k$ zvolíme libovolně $\rightarrow \pi_k \notin X_{k-1} \Rightarrow \exists \pi_{k-1} \in X_{k-1}$: $\pi_{k-1} < \pi_k \dots$

↳ delší řetězec $\nexists \rightarrow$ v nějaké vrstvě by měl dva prvky \nless s porovnatelností.

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^k |X_i| \leq \sum_{i=1}^k \alpha = k \alpha = \omega \alpha \Rightarrow \underline{\omega \alpha \geq |X|} \quad \square$$